

دندان های
شیری

معاینه
دهان و دندان

وارنیش
فلوراید

توانمندسازی مربیان بهداشت مهدکودک

پیرامون آموزش،

معاینه دهان و دندان

و دندانپزشکی پیشگیری (وارنیش فلوراید و...)





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

محتویات آموزشی



سیستم دندان های شیری

معاینه دهان و دندان توسط دندانپزشک

معاینه دهان و دندان توسط مربی بهداشت

فلورایدتراپی توسط دندانپزشک

فلورایدتراپی توسط مربی بهداشت



سیستم دندان های شیری




فک بالا



فک پایین

- دندان پیشین مرکزی
- دندان پیشین جانبی
- دندان نیش
- دندان آسیاب اول
- دندان آسیاب دوم

دندان های کودک ۲ تا ۵ ساله



دندان های شیری

جوانه ی دندان های دائمی




نام گذاری دندان های شیری



EDCBA	ABCDE
EDCBA	ABCDE

نمای رو برو



نام گذاری دندان های شیری



بالا راست کودکی

بالا چپ کودکی

EDCBA | ABCDE


EDCBA | ABCDE

پایین راست کودکی

پایین چپ کودکی



شناسنامه سلامت دهان و دندان



شناسنامه سلامت دهان و دندان

کودکان مهدکودکی

شهرستان: نام مهد کودک:

نام و نام خانوادگی کودک: تاریخ تولد:

ثبت وضعیت دندان ها

سن	وضعیت دندانها	عادات غلط دهانی و موارد خاص	تاریخ	معاينه کننده
تا ۲ سالگی	<input type="radio"/> سالم <input checked="" type="radio"/> رویش نیافته <input checked="" type="radio"/> پوسیده	۱. مکیدن انگشت ۲. مکیدن پستانک ۳. شکاف لب ۴. شکاف کام ۵. پوسیدگی (پوس دندانها) ۶. تغییر در ریش		
۳ تا ۳ سالگی				
۳ تا ۴ سالگی				
۴ تا ۵ سالگی				
۵ تا ۶ سالگی				



معاینه دهان و دندان



بررسی نمای ظاهری صورت



تورم

تغییر رنگ



عدم تقارن





وسایل مورد نیاز جهت معاینه و فلوراید تراپی توسط دندانپزشک



آینه

وارنیش فلوراید

رول پنبه

پنس

سوند معاینه





معاینه دهان و دندان توسط دندانپزشک




آینه

سوند

نور
کافی





وسایل مورد نیاز جهت معاینه و فلوراید تراپی توسط مربی بهداشت



آبسلانگ

وارنیش فلوراید

گاز یا دستمال کاغذی





معاینه دهان و دندان توسط مربی بهداشت



آبسلانگ

چراغ قوه





انجام وارنیش فلوراید (فلوراید تراپی)



پایگاه سلامت دهان و دندان دانش آموزی امام علی (ع)

دانشگاه علوم پزشکی
وزارت بهداشت و درمان خراسان رضوی
مرکز بهداشت شماره ۲
محل اجرای طرح کشوری
وارنیش فلوراید (فلوراید تراپی)
دانش آموزان بدو ورود به مدرسه
پایگاه سنجش سلامت امام علی (ع)



وارنیش فلورايد





با توجه به رسوب فلوراید،
قبل از استفاده توسط برس
محلول به هم زده شود
تا قوام یکنواخت حاصل گردد





کاربرد مجدد
هر ۴ تا ۶ ماه یکبار
وارنیش فلوراید
جهت دستیابی به فوائد ضد پوسیدگی آن
ضروری است



ملاحظات قبل از انجام وارنیش فلوراید



۲

کودک مسواک زده
و دندان ها تمیز باشند

۱

بهتر است کودک صبحانه
صرف کرده باشد



ملاحظات پس از وارنیش فلوراید



۳

وارنیش فلوراید غالباً باعث تغییر رنگ دندان به رنگ زرد می‌گردد که بتدریج در عرض ۲۴ ساعت برطرف می‌شود

۲

بیمار تا صبح روز بعد نباید از مسواک یا نخ دندان استفاده کند تا وارنیش بیشترین فرصت را جهت تماس با دندان داشته باشد

۱

حداقل تا ۸ ساعت از خوردن غذاهای داغ و سفت (نظیر سیب و هویج و....) باید اجتناب شود











Luhdki



A close-up photograph of several pink cherry blossoms. The petals are a soft, light pink color, and the stamens are a darker, vibrant pink. The background is blurred, showing more blossoms and green foliage. The text is overlaid on the right side of the image.

به امید موفقیت روز افزون
با تشکر از توجه شما

در پناه ایزد منان